

ヒルドイド[®]ローション0.3%

150g ボトル(ポンプ付)を使用される方へ



1プッシュで一定量押し出すことが可能な容器
特性により**適正使用量の塗布を支援**します。
また、**広範囲へ両手で素早く塗布**することが
でき、**薬剤塗布の時間短縮**が期待できます。

ヒルドイド[®]ローション0.3%

150gボトル(ポンプ付)を使用される方へ

使用方法

使い方、使用量、使用回数は
医師・薬剤師の指示に従ってください

- 手をきれいにし、適量を手にとり、こすらずにやさしく塗ってください。
- 塗る部分が汗などで汚れている場合は、汚れをよく落としてから塗ってください。



使用量の目安

ヒルドイドローション150gボトル(ポンプ付)は1プッシュ押し出した量が「約1g」であり、**成人の手の面積の約4枚分に塗れます。**

■ 成人の場合¹⁾

成人における **部位別・全身塗布時**の使用量の目安は下表のとおりです。

部位	1回使用量	本剤の場合
顔・首	約1g	1プッシュ
胸・腹 (背中含む)	約7g	7プッシュ
両腕	約3g	3プッシュ
両手	約1g	1プッシュ
両脚	約6g	6プッシュ
両足	約2g	2プッシュ
全身塗布時 合計	約20g	20プッシュ

■ 小児の場合²⁾

小児における **年齢別・全身塗布時**の使用量の目安は下表のとおりです。

年齢	1回使用量	本剤の場合
3～6か月	約4g	4プッシュ
1～2歳	約7g	7プッシュ
3～5歳	約9g	9プッシュ
6～10歳	約12g	12プッシュ

1) Long CC, et al : Clin Exp Dermatol, 16(6), 444, 1991より作図


2) Long CC, et al : Br J Dermatol, 138(2), 293, 1998より作図

使用上の注意点


- 皮膚が**ただれているところ**や**傷口、眼**には塗らないでください。
- 本剤を塗って、皮膚のかゆみ、かぶれなどがあらわれた場合は、塗るのを中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 高温、直射日光をさけて、**室温(1～30度)**で保管してください。
- 初めてご使用される際には、**ストッパーを取り外し、ボトルを立てて、3～4回空押しした後**、ご使用ください。
- 容器を**振ったり、逆さ**にして使用しないでください。規定量で吐出されない可能性があります。
- 吐出口部分は**水洗いしない**でください。吐出口部分が汚れた場合は**ティッシュ等でふき取って**ください。



ストッパーを外す



振らない



逆さにしない



洗わない

